

Oiseaux en période de reproduction
en basse vallée du Couesnon :
un vaste périmètre
qui réserve des surprises



Une voix pour la nature



GONm présent (données) sur zone depuis 1973 :
surtout Mont-Saint-Michel, anse de Moidrey, marais d'Aucey-la-Plaine,
marais de Boucey, marais du Mesnil, de Sougéal et de la Folie

BV présent (données) depuis 1989 :
surtout marais du Mesnil, de Sougéal et de la Folie

Participation GONm-BV ou les 2

Global : DOCOB baie du Mont-Saint-Michel avec CL (BV-GONm)

Sougéal : réserve naturelle de Bretagne depuis 2007 (BV)

Syndicat mixte Mont-Saint-Michel : depuis 2009 (BV-GONm-Biotope)

La Folie + sud Antrain : Espaces naturels sensibles d'Ille et Vilaine (BV)

Association GONm- BV : atlas des oiseaux de la baie du Mont-Saint-Michel (2009-2013)

Association BV : protocole printemps vallée du Couesnon, objectifs suivi des zones peu connues





Figure 1.19. Carte cumulative des prospections : points de localisation des espèces non communes (2009-2012)



+ contacts directs
avec d'autres organismes et structures

 **Espaces naturels sensibles**





Région Bretagne



Marais du Mesnil

Reproduction faible : globalement dans le marais et en oiseaux patrimoniaux :

- vanneau huppé (rare)
- bouscarle autour (1-2 couples)



Petit gabion et pourtour riche (roselières linéaires), haies basses




Figure 1 : Les marais de la basse vallée du Couesnon (Mary et Vial, 2009)

Boucey

Espèce (Boucey)	1973-1977	1978-1982	1983-1987	1988-1992
Bergeronnette flavéole	2	1	2	1
Bergeronnette grise	2	5	2	1
Bouscarle de Cetti	1	1	3	3
Bouvreuil pivoine	2	6	2	2
Bruant des roseaux	4	7	4	1
Bruant jaune	3		9	3
Bruant proyer	3	2	2	1
Bruant zizi	4	1	6	2
Coucou gris	2	4	2	10
Faucon crécerelle	1	4	17	5
Fauvette à tête noire	5	6	7	4
Gobemouche gris	2	2	2	3
Loriot d'Europe	2	1	4	7
Martin-pêcheur d'Europe	3	9	9	4
Mésange nonnette	2	4		
Moineau friquet	2	4	1	7
Phragmite des joncs	7	1	1	3
Pic cendré			4	2
Pic épeiche		3	5	6
Pic épeichette	1	3	2	
Pic vert	1	9	4	6
Rousserolle effarvatte			1	6
Sittelle torchepot	3	2	1	
Tarier des prés			6	2
Tarier pâtre	13	5	11	4
Tourterelle des bois	5	6	6	8
Total général	174	351	763	422



Juin 2016 (1 h)...test, très nombreux passereaux notamment pouillots et tourterelles des bois par exemple ;

Zone très originale :
unique en baie du Mont par disposition des haies saules et traitement ce celles-ci; très belles prairies de fauche



T. Quélenec




Y. Février

Aucey-la-Plaine

POTENTIEL IMPORTANT



loriot d'Europe–pigeon colombin
et corbeau freux au Guépérroux






Jeu de données modeste dans l'atlas
(très peu d'oiseaux d'eau)
de la baie du Mont-Saint-Michel
mais des originalités; améliorations depuis sur
zone cerclée en vert (roselières,
haies basses qui poussent)



C. Ransonnète

Localisation approximative des sites, des échecs et des réussites de nidification du foulque macroule sur la RNR du marais de Sougéal en 2012



0 250 500 750 1000 m Emprise RNR

Figure 15 : Observations collectées d'avril à juin dans le cadre du protocole annuel (bleu) et données récoltées uniquement lors des 3 sorties (avril-mai-juin) de recensement de toutes les espèces (points vert).



P. Percheron

Sacey




Zone en phase avec marais par la rive, originalité une colonie d'hirondelle de rivage qui s'installe dans une carrière mais exploite la vallée !



La Folie

Méthodologie pour synthèse

Suivi très important depuis 2013



A : Marais A B : Marais B

GH : Grèbe huppé, zone de présence de jeunes ; GH1 élevage complet de jeunes

Gca : Grèbe castagneux, zone d'observation de couples, parades ou jeunes

SE : Sarcelle d'été, zone d'observation d'un couple régulièrement

CCo : Canard colvert, présence d'un couple et jeunes


Fmi : Fuligule milouin, évaluation des zones de nidification et élevage des jeunes

R : Râle d'eau, zone où l'espèce est entendue majoritairement

G : Gallinule poule d'eau, évaluation des zones de nidification

F : Foulque macroule, situation des couples avec jeunes le 26/05

Zones de nidification ou de fréquentation des principales espèces d'oiseaux d'eau observées dans le marais en 2013



D. Marques




Figure 2 : Le marais de la Folie « proprement dit », de 1823 à nos jours



T. Quéler nec

Sud Antrain


La Fontenelle
Tremblay
Bazouges-la-Pérouse
(+ Flopperie)



Carte 2 : Localisation de l'ensemble des contacts obtenus sur les trois sorties.



F. Jallu



F. Jallu

Zones inter-marais




F. Jallu



Y. Février

Sougéal-Antrain



Des zones prometteuses



C. Caiveau





J. Le Bail

Beaucoup de données
accumulées par BV depuis 2013



F. Jallu

Hors Natura 2000



Pontorson

Zone actuellement modifiée (PGE observée)
Pontorson



Figure 7 : Vue sur Launay depuis l'intérieur du marais en 1998 (E.Chabot)



C. Caiveau



D. Ledan

Ça se ferme !!!!

Espèces communes ou généralistes (y compris bourgs et villes)
s'installent remplaçant des espèces patrimoniales ou plus « intéressantes »



T. Quélenec



A. Deniau



Figure 5.25. Vallée du Thar à Lézeaux (Jullouville)
actuellement.



Figure 5.26. Des « lambeaux » de roselière à
Lillemer.



- achat mairie zone hors RNB (6 ans)
- réaction immédiate repousse roselière
- espèces paludicoles s'installent : bouscarle de Cetti, rousserolles, phragmite des joncs, bruant des roseaux + foulque macroule...
- Intégration bientôt à RNB

FERMETURE MILIEU

Actuellement le plus préoccupant par rapports aux oiseaux mais aussi insectes ou botanique



Restaurations Mont-Saint-Michel



Remerciements :

Aux structures avec lesquelles on travaille directement depuis longtemps en confiance

(Syndicat Mixte Mont-Saint-Michel, RNB de Sougéal et les partenaires notamment la mairie, Conseil Départemental 35)...

À ceux qui ont mis en place les réflexions sur le DOCOB Natura 2000 (je pense notamment à Mickael Mary et Romain Vial) et ceux le poursuivent.

À Philippe Halnaut, Régis Morel et Elodie Bouttier (BV)

À paraître, version informatique

Photo tiré de GOB (coord.), 2012 - Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne.

Période 2004-2008. Coordination

Groupe ornithologique breton, Bretagne-Vivante-SEPNB, LPO 44, GEOCA. Delachaux et Niestlé : 512 p.

Gorgebleue à miroir, martin-pêcheur d'Europe, bruant jaune (C. Caiveau)

Vanneau huppé, Tourterelle des bois, héron cendré, bruant des roseaux (Y. Février)

Pouillot véloce, corbeau freux, râle d'eau, rougegorgefamilier (T. Quélenec)

Loriot d'Europe (H. Michel)

Pigeon colombin (S. Mauvieux)

Foulque macroule (C. Ransonnette)

Sarcelle d'été (P. Percheron)


Grèbe huppé (D. Marques)

Rousserolle verderolle, bruant des roseaux, échasse blanche (F. Jallu)

Rousserolle effarvatte, phragmite des joncs (J. Le Bail)

Fauvette des jardins (D. Ledan)

Merle noir (A. Deniau)



Groupe Ornithologique Normand



Bretagne Vivante - SEPNB



**Les oiseaux en période de reproduction
en baie du Mont-Saint-Michel**
(enquête 2009-2013)
Essai sur l'histoire récente (1970-2013)
répartitions et effectifs



Matthieu Beauflis