


Havre de Geffosses




1000 m

©IGN

Carte géologique 1/50 000 vecteur harmonisée (BRGM) créée en 2005

-  D
Dunes récentes (Quaternaire)
-  Fz
Alluvions récentes (Holocène)
-  SLB
Partie marine: sables fins à grossiers, sablons
-  VLB
Partie marine: sédiments vaseux
-  S
Dépôts de solifluxion indifférenciés (Quaternaire)
-  Mz
Dépôts marins sablo-argileux ou argilo-sableux (Quaternaire-Flandrien)
-  F-Mz
Dépôts fluvio-marins (Quaternaire-Flandrien)
-  Mu
Sables de Saint-Vigor (Quaternaire)
-  b2
Formation de Granville et de la Laize: siltites, argilites, grès, grauwackes et conglomérats (Briovérien supérieur)
-  b1âM
Paléovolcanites basiques de Montsurvent (Briovérien)
-  k2GL
Grès de Lessay (Cambrien supposé)
-  k2F
Schistes et grès de La Feuillie, Schistes et grès de Carteret (Cambrien)
-  ZSC FR2500080 - Littoral ouest du Cotentin de Bréhal à Pirou (MEDDE)
-  Limites communales (IGN)

Havre de Blainville




1000 m

©IGN

Carte géologique 1/50 000 vecteur harmonisée (BRGM) créée en 2005

- D
Dunes récentes (Quaternaire)
- Fz
Alluvions récentes (Holocène)
- SLB
Partie marine: sables fins à grossiers, sablons
- VLB
Partie marine: sédiments vaseux
- Dy
Sables éoliens (Quaternaire-Weichsélien)
- Mz
Dépôts marins sablo-argileux ou argilo-sableux (Quaternaire-Flandrien)
- F-Mz
Dépôts fluvio-marins (Quaternaire-Flandrien)
- b1
Formation de Saint-Lô: siltites, argilites, grès et phanites (Briovérien inférieur)
- Mv
Sables et galets marins (Quaternaire-Pléistocène inférieur-anté-Saalien)
- MzR
Tangues et sables récents (Quaternaire-Flandrien)
- b2Cg
Microconglomérats et conglomérats (Briovérien supérieur)
- b2
Formation de Granville et de la Laize: siltites, argilites, grès, grauwackes et conglomérats (Briovérien supérieur)
- iâC
Microgranites calco-alcalins (Cadomien)
- b1Mô
Métavolcanites de Montsurvent (Briovérien)
- b1MâC
Métamorphites du massif de Coutances (Briovérien)
- â5
Tonalite de Coutances (Néoprotérozoïque)
- b1âM
Paléovolcanites basiques de Montsurvent (Briovérien)
- b1ôM
Paléovolcanites acides et intermédiaires de Montsurvent (Briovérien)
- Hydro
Réseau hydrographique, points d'eau, bassins, étangs
- ZSC FR2500080 - Littoral ouest du Cotentin de Bréhal à Pirou (MEDDE)
- Limites communales (IGN)



1 km


©IGN

Carte géologique 1/50 000 vecteur harmonisée (BRGM) créée en 2005

-  Dépôts anthropiques, remblais, digues (Quaternaire)
-  D
Dunes récentes (Quaternaire)
-  Fz
Alluvions récentes (Holocène)
-  Fx
Alluvions saaliennes
-  C
Colluvions indifférenciées (Quaternaire)
-  SLB
Partie marine: sables fins à grossiers, sablons
-  VLB
Partie marine: sédiments vaseux
-  Dy
Sables éoliens (Quaternaire-Weichsélien)
-  OEy
Loess non carbonatés ou décalcifiés (Quaternaire-Weichsélien)
-  Mz
Dépôts marins sablo-argileux ou argilo-sableux (Quaternaire-Flandrien)
-  F-Mz
Dépôts fluvio-marins (Quaternaire-Flandrien)
-  b1
Formation de Saint-Lô: siltites, argilites, grès et phtanites (Briovérien inférieur)
-  Mv
Sables et galets marins (Quaternaire-Pléistocène inférieur-anté-Saalien)
-  b2Cg
Microconglomérats et conglomérats (Briovérien supérieur)
-  b2
Formation de Granville et de la Laize: siltites, argilites, grès, grauweekes et conglomérats (Briovérien supérieur)
-  b1Ph
Phtanites (Briovérien inférieur)
-  Lâ5
Altérites de la leucotonalite de Coutances

-  ä5
Altérites de la tonalite de Coutances
-  h1-2M
Calcaires de Montmartin-sur-Mer (Tournaisien-Viséen)
-  h1R
Grès du Robillard (Tournaisien)
-  o4-5C
Formation de Cerisy-la-Salle: grès quartziteux et schistes (Llandeilo-Caradoc)
-  b12
Briovérien indifférencié, métamorphisé dans le domaine des Schistes tachetés
-  k-oH (3)
Argilites, grès et quartzites rouges de Hyenville (Cambro-Ordovicien)
-  k-oH (2)
Argilites et grès verts de Hyenville (Cambro-Ordovicien)
-  Q
Filons de quartz (Néoprotérozoïque à Paléozoïque, en majorité)
-  k-oH (1)
Conglomérat de Pont-Brocard (Formation de Hyenville)(Cambro-Ordovicien)
-  iäC
Microgranites calco-alkalins (Cadomien)
-  ä4
Granodiorites cadomiennes à biotite seule
-  b1Mó
Métavolcanites de Montsurvent (Briovérien)
-  b1MâC
Métamorphites du massif de Coutances (Briovérien)
-  e-g
Sables, argiles, cailloutis, grès silicifiés conglomératiques (Eocène-Oligocène)
-  i
Lamprophyres, microdiorites, diabases (Dévono-Carbonifère ?)
-  ä5
Tonalite de Coutances (Néoprotérozoïque)
- Hydro
Réseau hydrographique, points d'eau, bassins, étangs
-  ZSC FR2500080 - Littoral ouest du Cotentin de Bréhal à Pirou (MEDDE)
-  Limites communales (IGN)

Dunes d'Annoville




1000 m

©IGN

Carte géologique 1/50 000 vecteur harmonisée (BRGM) créée en 2005

- D
Dunes récentes (Quaternaire)
- Fz
Alluvions récentes (Holocène)
- SLB
Partie marine: sables fins à grossiers, sablons
- VLB
Partie marine: sédiments vaseux
- Dy
Sables éoliens (Quaternaire-Weichsélien)
- Mz
Dépôts marins sablo-argileux ou argilo-sableux (Quaternaire-Flandrien)
- F-Mz
Dépôts fluvio-marins (Quaternaire-Flandrien)
- Mv
Sables et galets marins (Quaternaire-Pléistocène inférieur-anté-Saalien)
- DQy
Sables éoliens: galets de quartz éolisés (Quaternaire-Weichsélien)
- b2
Formation de Granville et de la Laize: siltites, argilites, grès, grauweekes et conglomérats (Briovérien supérieur)
- i
Lamprophyres, microdiorites, diabases (Dévono-Carbonifère ?)
- Hydro
Réseau hydrographique, points d'eau, bassins, étangs
- ZSC FR2500080 - Littoral ouest du Cotentin de Bréhal à Pirou (MEDDE)
- Limites communales (IGN)



1 km

©IGN

Carte géologique 1/50 000 vecteur harmonisée (BRGM) créée en 2005

-  D
Dunes récentes (Quaternaire)
-  Tz
Dépôts tourbeux (Quaternaire)
-  Fz
Alluvions récentes (Holocène)
-  Fx
Alluvions saaliennes
-  Fw
Alluvions elstériennes
-  SLB
Partie marine: sables fins à grossiers, sablons
-  VLB
Partie marine: sédiments vaseux
-  Dy
Sables éoliens (Quaternaire-Weichsélien)
-  OEy
Loess non carbonatés ou décalcifiés (Quaternaire-Weichsélien)
-  Mz
Dépôts marins sablo-argileux ou argilo-sableux (Quaternaire-Flandrien)
-  F-Mz
Dépôts fluvio-marins (Quaternaire-Flandrien)
-  d2-4N
Schistes et calcaires de Nêhou (Dévonien)
-  b1
Formation de Saint-Lô: siltites, argilites, grès et phtanites (Briovérien inférieur)
-  Mv
Sables et galets marins (Quaternaire-Pléistocène inférieur-anté-Saalien)
-  MzR
Tangues et sables récents (Quaternaire-Flandrien)
-  DQy
Sables éoliens: galets de quartz éolisés (Quaternaire-Weichsélien)
-  k1-3
Série des Grès de la Bloutière (Cambrien)

-  k1G
Grès feldspathiques bigarrés (Cambrien)
-  k1C
Conglomérats et grès pourprés (Cambrien)
-  b2
Formation de Granville et de la Laize: siltites, argilites, grès, grauwackes et conglomérats (Briovérien supérieur)
-  Q
Filons de quartz (Néoprotérozoïque à Paléozoïque, en majorité)
-  d1
Grès à *Platyorthis monnieri* (Dévonien)
-  i
Lamprophyres, microdiorites, diabases (Dévono-Carbonifère ?)
- Hydro
Réseau hydrographique, points d'eau, bassins, étangs

-  ZSC FR2500080 - Littoral ouest du Cotentin de Bréhal à Pirou (MEDDE)

-  Limites communales (IGN)